

ใบ Request Portable X-ray

ชื่อ-สกุล.....
HN.....AN.....
วันที่.....Ward.....

ปฏิบัติงานตามช่วงเวลา

- ☐ ☐ ผู้ป่วยที่อยู่ใน ICU หรือผู้ป่วยที่อยู่ใน ward สามัญ และได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ
- ☐ ☐ ผู้ป่วย vital sign ไม่ stable (BP<90/60 หรือ MAP <65, RR >30/min)
- ☐ ☐ ผู้ป่วยมี oxygen saturation <95% แม้ได้รับ oxygen supplement เต็มที่
- ☐ ☐ ผู้ป่วย alteration of conscious ต้อง restrain แม้ sedate แล้ว
- ☐ ☐ ผู้ป่วยหลังใส่ท่อช่วยหายใจ เอกซเรย์เพื่อประเมินตำแหน่งท่อช่วยหายใจ
- ☐ ☐ ผู้ป่วยหลังใส่ ICD หรือหลังท ำ PCNL
- ☐ ☐ ต้องการประเมินตำแหน่ง Central line
- ☐ ☐ ผู้ป่วยที่เป็น unstable angina, acute MI ที่ vital sign stsbale
- ☐ ☐ Dislocation of major joint ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ย้ายไปได้
- ☐ ☐ Fracture dislocation of C-spine ขณะท ำ skull traction
- ☐ ☐ อื่นๆ ระบุ.....

Emergency

- ☐ ☐ ผู้ป่วยที่มีอาการและอาการแสดงที่สงสัย pneumothorax หรือ hemothorax
- ☐ ☐ Newborn ที่ on ventilation แล้วยังมี cyanosis
- ☐ ☐ Severe acute dyspnea ที่ไม่ทราบสาเหตุ
- ☐ ☐ ผู้ป่วยอุบัติเหตุ multiple trauma ที่มี unstable vital sign ซึ่งจ ำเป็นต้องเอกซเรย์รีบด่วนเพื่อพิจารณาก่อนเข้าห้องผ่าตัด
- ☐ ☐ ผู้ป่วยที่เป็น unstsble angina, acute MI ที่vital sign unstsble
- ☐ อื่นๆ ระบุ.....

รอบการเอกซเรย์ Portable

เวรเช้า

รอบที่ 1 8.30 น.
รอบที่ 2 14.30 น.

เวรบ่าย

รอบ 22.00 น.

เวรดึก

ให้บริการ Case Emerganc เท่านั้น

แพทย์ผู้ส่งตรวจ.....

ใบ Request Portable X-ray

ชื่อ-สกุล.....
HN.....AN.....
วันที่.....Ward.....

ปฏิบัติงานตามช่วงเวลา

- ☐ ☐ ผู้ป่วยที่อยู่ใน ICU หรือผู้ป่วยที่อยู่ใน ward สามัญ และได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ
- ☐ ☐ ผู้ป่วย vital sign ไม่ stable (BP<90/60 หรือ MAP <65, RR >30/min)
- ☐ ☐ ผู้ป่วยมี oxygen saturation <95% แม้ได้รับ oxygen supplement เต็มที่
- ☐ ☐ ผู้ป่วย alteration of conscious ต้อง restrain แม้ sedate แล้ว
- ☐ ☐ ผู้ป่วยหลังใส่ท่อช่วยหายใจ เอกซเรย์เพื่อประเมินตำแหน่งท่อช่วยหายใจ
- ☐ ☐ ผู้ป่วยหลังใส่ ICD หรือหลังท ำ PCNL
- ☐ ☐ ต้องการประเมินตำแหน่ง Central line
- ☐ ☐ ผู้ป่วยที่เป็น unstable angina, acute MI ที่ vital sign stsbale
- ☐ ☐ Dislocation of major joint ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ย้ายไปได้
- ☐ ☐ Fracture dislocation of C-spine ขณะท ำ skull traction
- ☐ ☐ อื่นๆ ระบุ.....

Emergency

- ☐ ☐ ผู้ป่วยที่มีอาการและอาการแสดงที่สงสัย pneumothorax หรือ hemothorax
- ☐ ☐ Newborn ที่ on ventilation แล้วยังมี cyanosis
- ☐ ☐ Severe acute dyspnea ที่ไม่ทราบสาเหตุ
- ☐ ☐ ผู้ป่วยอุบัติเหตุ multiple trauma ที่มี unstable vital sign ซึ่งจ ำเป็นต้องเอกซเรย์รีบด่วนเพื่อพิจารณาก่อนเข้าห้องผ่าตัด
- ☐ ☐ ผู้ป่วยที่เป็น unstsble angina, acute MI ที่vital sign unstsble
- ☐ อื่นๆ ระบุ.....

รอบการเอกซเรย์ Portable

เวรเช้า

รอบที่ 1 8.30 น.
รอบที่ 2 14.30 น.

เวรบ่าย

รอบ 22.00 น.

เวรดึก

ให้บริการ Case Emerganc เท่านั้น

แพทย์ผู้ส่งตรวจ.....